



**GRUPPO MICOLOGICO DELLA MARCA  
TREVIGIANA  
PIER ANDREA SACCARDO**



**NUOVA MICOLOGIA**

Scheda N° 29 / 2 -- 2023 Exs. N° SI

<b>Taxon - Ord.</b> <i>Pezizales</i>	<b>Fam.</b> <i>Pezizaceae</i>	<b>Nome volgare :</b> <i>scodella</i>
<b>Genere, specie, eventuale rango intraspecifico, autore</b> <i>Tarzetta cupularis</i> (L. ex Fr.) Lamb. ss. Dennis (1978)		
<b>Sinonimi :</b> <i>Tarzetta cupularis</i> (L. : Fr.) Svrcek (1981)		

<b>Dati relativi alla raccolta</b>	<b>Data</b> 09 - 05 - 2023
<b>Località :</b> uscita al Nevegal --- 07 / 05 / 2023	<b>Alt. s.l.m. :</b> 1030 m
<b>Comune :</b> Belluno	<b>Prov. :</b> BL
<b>Habitat</b> ( <i>vegetazione, matrice di crescita</i> ) : anche in terreno nudo, o bordi di sentieri ecc....	
<b>Raccogliitore :</b> Soci del Gruppo Saccardo di Treviso	<b>Foto (si/no) :</b> si

**Caratteri Macroscopici** (*indicare le principali caratteristiche macroscopiche, i dati organolettici e le eventuali reazioni macrochimiche*)


Ascoma a forma di coppa, diametro da 8 - 12 mm, con breve stipite  
Superficie imeniale liscia, di colore ocra misto a toni grigiastri già allo stadio giovanile  
Superficie esterna da liscia a finemente granulosa, con evidente forforosità marginale sotto forma di basse pustole, colori di fondo ocracei frammentati a tonalità grigiastre, bordo finemente dentellato  
Carne cassante, acquosetta, abbastanza fragile, punta con uno spillo non sacerne siero, sapore non rilevante, odore leggero non spermatico



*Tarzetta cupularis*

**Caratteri microscopici** (*indicare le principali caratteristiche microscopiche, riportando le misurazioni degli elementi osservati, il liquido di osservazione impiegato e le eventuali reazioni chimiche*)

Spore 21 - 23 X 11 - 14 um, ellittiche, guttulate, à maturità pluriguttulate, al Melzer leggermente metacromatiche, a parete spessa  
Aschi 250 - 280 X 15 - 16 um, contenenti otto-spore uniseriate, J- negativo all' apice, cilindrici, opercolo laterale, con base aporinca  
Parafisi esili settate, ramificate alla base, con apice debolmente clavato di 4 - 5 um,  
Sezione :  
Subimenio a texture intricata poco differenziata dall' excipulum sottostante  
Excipulum medullare a texture intricata formato da cellule filamentose, brevemente settate,  
Excipulum ectale a texture angularis, composto da uno strato esterno di cellule (ife) catenulate (peli)



**Caratteri macroscopici** (indicare le principali caratteristiche macroscopiche che hanno condotto con particolare riferimento al confronto con le specie simili)

Coppa a forma di calice, con margine finemente dentato, ricoperto da un velo ragnatetoso, di colore grigio-ocra

Superficie esterna finemente granulosa, con evidente forforosità marginale sotto forma di basse pustole

Piede non molto lungo, costolato, infisso nel terreno

**BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA consultata** (indicare i testi specialistici impiegati per la determinazione)

CHAMPIGNONS DE SUISSE -- di J. Breitenbach / F. Kranzlin -- Tome 1 -- pag. 86

A.M.I.N.T. -- Associazione Micologica e Botanica -- di Pietro Curti -- forum e schede

A.M.B. -- Gruppo di Muggia e del Carso -- di Marino Zugna -- forum e schede

Atlante fotografico degli Ascomiceti d' Italia -- di Gianfranco Medardi -- pag. 283

I funghi dal vero -- di Bruno Cetto -- Vol. 5 -- pag. 2100

DETERMINAZIONE E COMPILAZIONE DELLA  
SCHEDA A CURA DI: **Rodolfo Giroto**

REVISIONE A  
CURA DI: **Rodolfo Giroto**