





**NOTE DETERMINATIVE** (indicare i caratteri che hanno condotto alla determinazione della specie, con particolare riferimento al confronto con le specie simili)

L'aspetto a nido di questo fungo è comune anche ad altre entità; tra esse *Cyathus stercoreus*, con superficie esterna pelosa, da oca-brunastra a grigio-nerastra, con superficie interna liscia e nerastra, sul cui fondo sono sistemati alcuni peridioli di 1-2 mm. di diametro, lentiformi e neri. Vive su suolo grasso o su residui bruciati in estate-autunno, ed ha spore di 25-40 X 20-25 µm., irregolarmente globose. *Cyathus olla* ha la superficie esterna della coppa poco solcata, grigia o grigio-bruna, da pelosa a liscia, ed una superficie interna grigiasta sulla quale sono adagiati una decina di peridioli grigio-bruni e lentiformi, vive in estate-autunno sul terreno (raramente su residui vegetali), e ha spore ellissoidali di 8-14 X 5-8 µm.. La distinzione fra i generi *Cyathus* e *Crucibulum* (di aspetto simile) si basa principalmente sulla natura della tunica dei peridioli che risulta molto più spessa in *Crucibulum*

**BIBLIOGRAFIA CONSULTATA** (indicare i testi specialistici impiegati per la determinazione)

- Funghi d'Italia -- di C. Papetti, G. Consiglio, G. Simonini -- Vol. 1 - pag. 459
- MushroomExpert.Com -- di Michael Kuo -- schede
- CHAMPIGNONS DE Suisse -- di J. Breitenbach / F. Kranzlin - Tome 2 - pag. 380
- M.W. California Funghi - foto di Taylor F. Lockwood -- pag. 560 -- schede
- A.M.I.N.T. - Associazione Micologica e Botanica -- schede

DETERMINAZIONE E COMPILAZIONE DELLA  
 SCHEDA A CURA DI: **Rodolfo Girotto**

REVISIONE A  
 CURA DI: **Rodolfo Girotto**